

MoviGo® Duo

Drickfärdig lösning i dospåsar

MEDICINTEKNISK PRODUKT

För effektiv och skonsam behandling och lindring av förstoppning i samband med gasbildning och uppsvälldhet.

1. Vad produkten är och vad den används till

MoviGo Duo är en medicinteknisk produkt som är utformad för att lindra förstoppning svårigheter att tömma tarmen, särskilt i samband med gasbildning och uppsvälldhet.

MoviGo Duo innehåller makrogol 4000 för behandling av förstoppning och simetikon för att lindra uppblåsthet

Makrogol 4000, mjukar upp avföringen genom att dra in vatten i tarmen. Detta bidrar till att hålla avföringen mjuk och därmed lättare att få ut, vilket gör tarmtömningen mer bekväm och regelbunden, utan att orsaka ett plötsligt eller akut behov av att gå på toaletten. Makrogol 4000 tas inte upp av kroppen. Det passerar genom matsmältningssystemet och utsöndras tillsammans med avföringen.

Simetikon bryter ned instängda gasbubblor och hjälper till att minska gasbesvär i samband med förstoppning.

1.1 Sammansättning

Varje dospåse innehåller:

10 g makrogol 4000, 100 mg simetikon

Hjälpämnen: Vatten, sukralos, apelsinaromer, vegetabiliskt glycerin, polysorbat 80, sackarosestrar, kaliumsorbat.

2. Dosering och behandlingslängd

Den rekommenderade dosen är:

- Barn från 1 år upp till 6 år: 1 dospåse dagligen.
- Vuxna och barn från 6 år: 2 dospåsar dagligen.

Drick produkten direkt ur påsen eller späd ut med vatten vid behov. Det är lämpligt att ta produkten mellan måltiderna.

Det är inte nödvändigt att justera dosen hos patienter med nedsatt njurfunktion.

Behandlingstiden är vanligtvis 2 veckor. Upprepad eller förlängd behandling kan dock vara nödvändig vid svårbehandlad eller kronisk förstoppning. Sådan förstoppning kan orsakas av läkemedel såsom smärtstillande medel (opioider) eller läkemedel för behandling av Parkinsons sjukdom (antikolinergika). Sjukdomar som multipel skleros eller Parkinsons sjukdom kan orsaka svårbehandlad förstoppning.

Använd inte denna produkt mer än 30 dagar i följd utan att rådfråga läkare.

3. Kontraindikationer

Får inte tas vid intolerans mot produkten eller känd överkänslighet mot något av innehållsämnen eller polyetylglykol.

Använd inte denna produkt till barn under 1 år.

Ta inte denna produkt om du lider av:

- stenosis i tarmarna
- perforering av tarmen
- inflammatorisk tarmsjukdom (t.ex. Crohns sjukdom, ulcerös kolit).

Ta inte vid tarmobstruktion.

4. Graviditet och amning

Det finns inga tillgängliga uppgifter om användning av denna produkt under graviditet eller amning. Om du är gravid, försöker bli gravid eller ammar, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar denna produkt.

5. Eventuella biverkningar

Det rekommenderas att inte överskrida den föreslagna dosen, eftersom högre doser kan orsaka oväntade biverkningar.

Gastrointestinala störningar såsom borborygmi, buksmärta, illamående och mild diarré (särskilt i början) kan förekomma. Om biverkningarna förvärras eller inte försvinner inom några dagar, eller om du märker av några biverkningar som inte anges i denna bruksanvisning, kontakta din läkare.

I sällsynta fall kan överkänslighetsreaktioner (utslag och nässelutslag) förekomma. Om du upplever dessa biverkningar ska du sluta ta produkten och omedelbart kontakta din läkare.

6. Interaktioner med kosttillskott och läkemedel

Denna produkt kan påverka upptaget av andra läkemedel om de tas vid samma tidpunkt. I synnerhet kan den osmotiska effekten av makrogol och den snabbare tarmpassagen minska deras effekt.

Det är därför lämpligt att ta produkten minst 2 timmar efter intag av läkemedel som tas via munnen eller andra mediciner eller kosttillskott. Rådfråga läkare innan du tar denna produkt om du tar andra mediciner.

7. Förvaring

Förvara produkten torrt, mellan 15 °C och 25 °C, och skyddad från direkt värme och ljuskällor. Öppna dospåsen först när den ska användas. Använd inte en skadad dospåse. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

8. Varningar och försiktighet

För att bibehålla en god hälsa, inklusive en frisk tarm, rekommenderas att du följer en lämplig diet och dricker tillräckliga mängder vätska (i allmänhet 2,0 till 2,5 liter dagligen).

Läkare bör rådfrågas innan användning av denna produkt till barn.

Simetikon kan påverka effekten av vissa reagenser som används vid diagnostik, t.ex. guajakgummi.

9. Utgångsdatum

Använd inte produkten efter utgångsdatumet som anges på förpackningen. Utgångsdatumet gäller vid intakt förpackning och korrekt förvaring enligt anvisningarna.

10. Kassering

Utgången produkt ska hanteras enligt bestämmelserna om avfallshantering i ditt land. Skräpa inte ned, utan ta hand om produktens förpackningsavfall på ett korrekt sätt.

Detta frågeformulär är en del av obligatorisk säkerhetsövervakning.

Ditt deltagande hjälper oss att säkerställa produktens kvalitet och säkerhet.

Vänligen ta några minuter för att fylla i frågeformuläret på följande adress:

<https://siit-pms.com/GC06>

eller genom att skanna denna QR-kod:



MoviGo Duo, Norgine och segellogotypen är varumärken som tillhör Norgine-koncernen.




SIIT srl

Via Ariosto 50/60

20090 Trezzano sul Naviglio (MI) ITALIEN



Norgine Danmark A/S, Kirsten Walthers Vej 8A, 2500 Valby, Danmark



Senast reviderad: 10/2025